

CONSIGLI FLOVER

GIARDINAGGIO

# Semina del prato



*Tutto quello  
che avete sempre voluto sapere  
e non avete mai  
osato chiedere.*



I prati seminati in **autunno** diventano rapidamente folti e compatti, perché il terreno è ancora caldo, c'è abbondante umidità atmosferica e la temperatura è ormai fresca. In queste condizioni la germinazione avviene entro 7-10 giorni e il prato in formazione richiede minori consumi idrici. È consigliabile provvedere alla semina in un periodo in cui non siano previsti forti temporali: gli acquazzoni provocano pozzanghere e spostano i semi appena sparsi.

• Prima della semina, occorre **preparare il terreno**: deve essere lavorato e concimato con sostanza organica, poi rastrellato per eliminare sassi, zolle grossolane, resti di radici. Qualora sia stato effettuato un diserbo, lasciate passare almeno 4 settimane

prima di seminare. Per rendere la superficie livellata e appena umida eseguite una rullatura e, quindi, procedete a una leggera irrigazione.

• La **semente** va distribuita in modo omogeneo, senza eccedere con le quantità.

Le dosi raccomandabili sono le seguenti:

- 20-30 g/mq per prato all'inglese di tipo pregiato;  
- 10-20 g/mq per prato calpestabile rustico.

Utilizzando un attrezzo spandisemi, ed effettuando un doppio passaggio incrociato, si ottiene una distribuzione più uniforme e regolare.

• A semina completata, occorre **rastrellare** leggermente per far penetrare i semi nel terreno che successivamente va compattato (si usa un rullo o il badile di piatto). Infine,

è indispensabile l'**irrigazione a getto finissimo**, a più riprese nei giorni successivi. Un telo di tessuto-non tessuto steso sull'area seminata è d'aiuto per evitare che gli uccelli facciano razzia di semi.

### Le prime tosature

Non appena l'erba del prato raggiunge 5-8 cm di altezza, si rulla la superficie per favorire l'assettamento delle radici. Due o tre giorni più tardi, l'erba va rasata a un terzo circa della sua altezza. Dopo il taglio, lo sfalcio va raccolto con cura: i residui possono contribuire alla formazione del feltro, che è causa di asfissia radicale. In seguito, tagli frequenti e regolari favoriranno la formazione di una superficie compatta, riducendo la presenza delle malerbe.

### Risanare un prato

La **trasemina** è un'operazione che consente di risanare i manti erbosi impoveriti. Va eseguita preferibilmente a metà autunno. Dopo aver rasato il prato e passato l'arieggiatore, per eliminare feltro e muschio, si distribuisce una semente del tipo da rigenerazione, si stende sulla superficie un po' di terriccio e si passa il rullo. Irrigando regolarmente, la nuova erba germina nel giro di qualche giorno conferendo al prato un aspetto compatto.

