

CONSIGLI FLOVER

PIANTE

Il geranio



*Tutto quello
che avete sempre voluto sapere
e non avete mai
osato chiedere.*



Il più popolare e diffuso dei fiori da balcone e giardino è di origine sudafricana. Facile e robusto, fiorisce continuamente per diversi mesi e, se protetto in inverno, sopravvive per 2-3 anni e più; si moltiplica con facilità per talea (cioè mettendone un rametto a radicare in terriccio sabbioso).

- Esistono diversi tipi di geranio (*Pelargonium*). Il geranio **zonale** è quello classico, con foglie profumate e leggermente pelose; ama il sole ma le temperature estive molto alte ne rallentano la fioritura. I gerani **edera** e **parigini**, adatti a cassette

e vasi appesi, hanno portamento ricadente e buona resistenza al sole e alla siccità. I gerani **imperiali**, dal fiore molto bello, sono i più delicati e la fioritura è più breve. I gerani **a foglia profumata** hanno fiori poco interessanti, ma emanano fragranze squisite.

- Il geranio è venduto in piccoli vasi di plastica o cotto: è indispensabile trasferire al più presto l'esemplare in un vaso di terracotta o plastica più capiente, con un fondo drenante (palline di argilla o ghiaia) e buon terriccio, meglio se del tipo specifico. Non va messo subito in

pieno sole, bensì abituato gradualmente a una **esposizione soleggiata**.

- Il geranio, se esposto al sole e al vento, va **irrigato quotidianamente** o a giorni alterni, possibilmente di mattina. La concimazione va effettuata ogni 8-12 giorni da maggio a metà luglio, poi ogni 15 giorni fino a settembre per sospenderla con l'arrivo dell'autunno. La pronta asportazione delle foglie secche e dei fiori appassiti agevola la formazione di nuovi boccioli. Da metà ottobre fino a metà aprile va ritirato in ambiente luminoso e fresco (intorno ai 10-15 °C).

Da cosa difenderli

- Il **verme del geranio** provoca seri danni bucherellando il fogliame e scavando gallerie nei fusti, che anneriscono e seccano. Va combattuto ai primi segnali con un insetticida, meglio se biologico, ripetendo il trattamento ogni 15 giorni.
- Il **moscerino bianco** si diffonde con clima umido e afoso: oltre al trattamento insetticida occorre migliorare la circolazione dell'aria intorno alle piante e la loro esposizione al sole.
- Il **marciume radicale** è provocato da ristagno di acqua nel suolo; si manifesta con un rapido indebolimento vegetativo. Va evitato assicurando un buon drenaggio. Ricordate sempre che se dopo 30 minuti dall'irrigazione l'acqua fuoriuscita dai fori di fondo del vaso non è stata assorbita, va eliminata.

